



LEPTOS-10

Suspensión estéril inyectable

NUMERO DE REGISTRO B-1069-004

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

1x10⁹ de cada una de las siguientes serovariedades de *Leptospira inactivadas*:

<i>L. ballum</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. bataviae</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. icterohaemorrhagiae</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. pomona</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. tarassovi</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. canicola</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. sejroe</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. hardjo</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. grippotyphosa</i>	1x10 ⁹ *
<i>L. wolffi</i>	1x10 ⁹ *
Adyuvante c.b.p.	1 mL

*Bacterias inactivadas/mL

INDICACIONES:

Para la prevención de la leptospirosis en bovinos y porcinos.

ESPECIES:

Bovinos y porcinos.

DOSIS:

En bovinos y porcinos: 2 mL

Se recomienda administrar 2 dosis con intervalos de 30 días, a partir de los 3 meses de edad. Revacunar anualmente con una sola dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea o intramuscular.

ADVERTENCIAS:

Manténganse fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en un lugar fresco y seco alejado de la luz del sol.

Consérvese en refrigeración a temperatura entre 4° y 8°C.

No congelar.

Vacune únicamente animales sanos.

Utilice material estéril al aplicar.

Una vez utilizado el producto, incinerar o destruir el envase.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO.

PRESENTACIONES:

10 dosis (20 mL) y 50 dosis (100 mL)

