

GENTAMOX

Amoxicilina y gentamicina, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR ML:

Amoxicilina trihidrato 150 mg
Gentamicina (sulfato) 40 mg

La amoxicilina y la gentamicina son dos conocidos antibióticos que, aislados, tienen particulares e interesantes propiedades terapéuticas y que, unidos, poseen un amplio espectro antibacteriano que abarca microorganismos Gram (+) (principalmente *Streptococcus*, *Staphylococcus* y *Corynebacterium*) y Gram (-) (principalmente *Escherichia coli*, *Pasteurellas*, *Salmonellas* y *Pseudomonas*) y que en pruebas «in vitro» demuestran ser sinérgicos frente a los mismos. Ello, unido a la buena difusibilidad y a su presentación en suspensión oleosa, permite realizar un tratamiento con un efecto sostenido y mantenido en el tiempo, lo cual hace que la asociación gentamicina-amoxicilina que presentamos en el producto GENTAMOX mejore las propiedades terapéuticas de cada uno de estos antibióticos aplicados individualmente.

INDICACIONES:

Cerdos: Neumonía, Colibacilosis, Metritis, Diarreas, Enteritis bacterianas y Mamitis.

Ovidos y Cápridos: Neumonía, Diarreas, Enteritis bacterianas, Pasteurellosis y Colibacilosis.

Bóvidos: Neumonía, Diarreas, Enteritis bacterianas, Mamitis, Metritis y Abscesos cutáneos.

Équidos: Neumonía, Diarreas, Enteritis bacterianas, Infecciones genitourinarias, Papera, Abscesos cutáneos y Afecciones podales.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Tratamientos prolongados con dosis superiores a las recomendadas, pueden ser causa de disfunciones renales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

POSOLÓGIA:

Cerdos, Ovidos y Cápridos: 5 a 10 ml/animal adulto/día; y 1 a 5 ml/animal joven/día.

Bóvidos: 30 a 40 ml/bóvido adulto/día; y 10 a 15 ml/ternero/día.

Équidos: 30 a 50 ml/équido adulto/día; y 5 a 15 ml/potro/día.

En general, administrar 1 ml/10 kg p.v./día, durante 3 días.

En dosificaciones altas, por ejemplo bóvidos y équidos, es recomendable repartir el producto en 2 puntos de inoculación, para favorecer su absorción.

SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de intoxicación por sobredosificación, suspender la medicación y administrar una terapia sintomática. Para evitarlo, no superar la dosis de 3 ml/10 kg p.v.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 30 días.

Leche: 2 días.

OBSERVACIONES:

- Este producto contiene un compuesto a base de aceite mineral. En caso de autoinyección accidental, puede causar dolor agudo e inflamación. Limpie y desinfecte la herida inmediatamente, acuda al médico y enseñe este prospecto.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Guardar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

- Agitar enérgicamente antes de usar. Cuando el frasco ha permanecido en reposo durante algún tiempo, es normal la separación del producto en dos capas, que se resuspenden fácilmente por agitación.

PRESENTACIÓN:

Frasco 100 ml.

Envase 12 fr de 100 ml.

Reg. No. ES240-07-01-1709
Prescripción veterinaria

PARA USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com