

# GRIPORK

## Vacuna inactivada, influenza porcina, en emulsión inyectable

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS

#### ACTIVAS:

##### Por dosis (2 ml):

Virus influenza porcina inactivado, cepa A(H1N1)OLL  $\geq 1/50$  IHA\*

Virus influenza porcina inactivado, cepa A(H3N2)G  $\geq 1/50$  IHA\*

\*Título de Inhibición de Hemoaglutinación.

#### INDICACIÓN DE USO:

Para estimular la inmunidad contra la influenza porcina.

#### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Puede aparecer una reacción anafiláctica esporádica en algún animal sensibilizado. En tal caso administrar un tratamiento adecuado.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

#### ESPECIES DE DESTINO:

Porcino.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Cerdos:** 2 ml/cerdo.

El método de administración es por inyección intramuscular en los músculos del cuello.

##### Programa vacunal recomendado:

**Cerdas:** Vacunar a todas las cerdas, independientemente de su condición (embarazo o lactancia) y revacunar 21 días después. Además, se recomienda revacunación periódica cada 6 meses o en cada ciclo reproductivo 1 mes antes del parto.

**Verracos:** Vacunar a todos los animales y revacunar 21 días después. Entonces, revacunar cada 6 meses.

**Lechones:** Vacunar entre los 30-50 días de edad y revacunar en 21-28 días.

**Cerdos de engorde:** Vacunar a todos los animales al entrar en las instalaciones de engorde y revacunar 21 días después.

#### TIEMPO DE ESPERA:

Cero días.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener alejado de los niños y animales domésticos.

Conservar y transportar refrigerado (entre +2 °C y +8 °C). No congelar.

Proteger de la luz.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

#### ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES):

##### Precauciones especiales para cada especie de destino

Vacunar solo animales sanos.

#### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

##### Al Usuario:

Este medicamento contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar un dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente.

En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento, busque urgentemente consejo médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo.

##### Al Facultativo:

Este medicamento contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento puede causar una inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

##### Gestación y lactancia

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

##### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se ha descrito ninguna. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

##### Sobredosificación

No causa ningún efecto secundario.

##### Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

##### Formatos:

Botella de 50 ds (100 ml).

Reg. nº ES240-64-34-10229  
Prescripción veterinaria

USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com