

# HIPRASUIS GLÄSSER

**Vacuna inactivada, enfermedad de Glässer, en suspensión inyectable**

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS:

Composición por dosis (2 ml):

*Haemophilus parasuis* inactivado, serotipo 1 > 1/16 MAT\*

*Haemophilus parasuis* inactivado, serotipo 6 > 1/16 MAT\*

\*MAT: Título medio obtenido por el ensayo de microaglutinación en placa.

## INDICACIONES DE USO:

Para la inmunización activa de cerdos para reducir la infección, los signos clínicos y la mortalidad causados por la Enfermedad de Glässer.

## CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

## REACCIONES ADVERSAS:

Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse un antihistamínico.

En caso de inoculación defectuosa en tejido subcutáneo pueden aparecer reacciones locales que remiten a los pocos días.

Debido al adyuvante utilizado pueden producirse en algunos animales reacciones locales en el punto de inoculación que desaparecen a los pocos días.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

## ESPECIES DE DESTINO:

Porcino (cerdas, lechones y lechones destetados).

## POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Cerdos:** 2 ml/animal, independientemente de su peso, edad y sexo.

El método de administración es por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja.

Programa vacunal recomendado:

**Cerdas:** Vacunación de todo el efectivo con una dosis a partir de las 3-4 semanas de edad, aplicando una dosis de recuerdo 3 semanas más tarde. Revacunar cada 6 meses.

**Lechones y lechones destetados:** Vacunación a las 3-4 semanas de edad, revacunando 3 semanas después.

## TIEMPO DE ESPERA:

Cero días.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar y transportar refrigerado (entre +2 y +8 °C).

No congelar. Proteger de la luz.

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

## ADVERTENCIAS ESPECIALES:

**Advertencias especiales para cada especie de destino**

Vacunar únicamente animales sanos.

**Precauciones especiales para su uso en animales**

Usar material estéril para su administración.

**Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales**

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

**Gestación y lactancia**

Puede administrarse durante la gestación y la lactancia.

**Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario**

No provoca ninguna reacción adversa al administrar 2 veces la dosis recomendada, diferentes a las producidas con la vacunación a dosis normal.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

Formatos:

Caja con 1 vial de 50 dosis (100 ml).

Reg. No. ES240-64-58-12618

Prescripción veterinaria

USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com