

HIPRAVIAR SHS

Vacuna viva, Rinotraqueítis pavos y Síndrome cabeza hinchada, en liofilizado oculonasal

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S):

Una dosis (0,03 ml) contiene:

Virus de la rinotraqueítis del pavo, vivo atenuado, cepa 1062: $10^{2,4}$ - $10^{4,4}$ DICC₅₀*

*Dosis infectiva 50% en cultivo celular.

INDICACIÓN(ES) DE USO:

Prevención de la Rinotraqueítis del pavo y del Síndrome de la cabeza hinchada en pollos de engorde, gallinas-pollitas futuras ponedoras y reproductoras, y en pavos.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Ninguna.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves.

POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oculonasal, administración en el agua de bebida y nebulización.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para la administración **oculonasal**, una vez disuelto el liofilizado con el diluyente adjunto, administrar una gota de vacuna (0,03 ml aproximadamente) por ave, en el ojo u orificio nasal, mediante un gotero estandarizado (normalmente 30 ml para 1.000 dosis).

Para la administración mediante **nebulización** (gota gruesa), llenar el aparato a utilizar con agua sola y rociar la superficie que ocupan las aves a vacunar. Comprobar la cantidad de agua utilizada y ésta es la que habrá que utilizar para mezclar con las dosis necesarias, según las aves a vacunar. Se pueden utilizar los siguientes volúmenes a título orientativo:

Dosis	Aves de cualquier edad (gota gruesa)
1.000	200-250 ml

Para la administración en el **agua de bebida**, disolver el liofilizado llenando el frasco que lo contiene hasta la mitad con agua fresca potable, agitar y verterlo en el recipiente que contenga el agua vacunal hasta un volumen tal de agua de bebida que pueda ingerirse en media hora o una hora como máximo. A modo orientativo, el consumo medio aproximado de agua para 1.000 aves es el siguiente:

Edad aves	Cantidad aproximada de agua para 1.000 aves
1 - 3 semanas	5 - 10 litros
4 - 9 semanas	12 - 23 litros
10 - 16 semanas	27 - 37 litros
18 - 22 semanas	37 - 50 litros

En caso de administración por vía oral, no utilizar aguas cloradas o con desinfectantes, sino agua potable sola. Evitar temperaturas altas del agua en la que se disuelve el liofilizado.

Programa vacunal orientativo:

Pollos de engorde: Vacunar entre los 14 y 20 días de edad. En zonas endémicas de enfermedad, vacunar durante la 1ª semana de vida y revacunar a la 3ª semana.

Gallinas (pollitas futuras ponedoras y reproductoras): Seguir el plan vacunal según la incidencia de enfermedad en la zona. En general vacunar a las 10 semanas de vida y revacunar con vacuna inactivada y/o viva antes de la producción (18-22 semanas).

Pavos: Vacunar durante la 1ª semana de vida revacunando a las 4-5 semanas.

TIEMPO DE ESPERA:

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener alejado de los niños y animales domésticos.

Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C).

Proteger de la luz. No congelar.

ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES):

Advertencias especiales para cada especie de destino

Debe evitarse vacunar aves enfermas, vacunando sólo aves sanas.

Asegurarse de que cada ave reciba una dosis como mínimo.

Precauciones especiales para su uso en animales

Comprobar la fecha de validez del producto.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

La administración vía nebulización requerirá usar un equipo de protección personal consistente en mascarilla y gafas protectoras al manipular el medicamento veterinario.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No usar en aves durante la puesta.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

HIPRAVIAR SHS puede interaccionar con otras vacunas vivas contra la Enfermedad de Newcastle o contra la Bronquitis Infecciosa Aviar, siendo recomendable separar la administración de HIPRAVIAR SHS como mínimo dos semanas con dichas vacunas.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario distinto a los indicados anteriormente. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario

No se han descrito efectos adversos al administrar 10 veces la dosis recomendada.

Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO:

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Formatos:

Caja con 10 viales de 1.000 dosis de liofilizado.

Caja con 10 viales de 5.000 dosis de liofilizado.

Caja con 10 viales de 1.000 dosis de disolvente.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Reg n° ES240-65-91-8474
Prescripción veterinaria

USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com