

# HIPRAVIAR TRT

## Vacuna inactivada, Rinotraqueítis pavos y Síndrome cabeza hinchada, en emulsión inyectable

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S):

Cada dosis de vacuna (0,5 ml) contiene:

Virus de la Rinotraqueítis del pavo inactivado, cepa 1062: ELISA  $\geq$  196 (\*)

(\*) ELISA = Título de anticuerpos anti TRTV expresado en unidades ELISA.

### INDICACIÓN(ES) DE USO:

Para la inmunización activa en gallinas y pavos para prevenir el Síndrome de la cabeza hinchada y la Rinotraqueítis del pavo.

### CONTRAINDICACIONES:

No procede.

### REACCIONES ADVERSAS:

Si la inoculación por vía subcutánea no es correcta y se realiza por vía intradérmica, puede producirse un edema regional de evolución favorable.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

### ESPECIES DE DESTINO:

Aves (gallinas ponedoras, gallinas reproductoras y pavos).

### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN:

La posología es de 1 dosis de 0,5 ml/ave.

El método de administración es por inyección intramuscular en la pechuga o subcutánea en la parte dorsal media del cuello.

En aves de aptitud cárnica (pavos) se recomienda siempre la vía subcutánea.

En general, es aconsejable vacunar las pollitas reproductoras y ponedoras antes de la puesta (18 semanas), aunque bajo prescripción facultativa, la vacuna puede administrarse en cualquier momento durante la cría y recría, revacunando antes de la puesta (18 semanas).

Pavos: Vacunar dentro de los primeros 20 días de vida.

### INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Administrar la vacuna cuando esté a una temperatura de +15 a +25 °C.

Agitar antes de usar.

### TIEMPO DE ESPERA:

Cero días.

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar y transportar refrigerado (entre +2 y +8 °C). No congelar.

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

### ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES):

#### Precauciones especiales para su uso en animales

Vacunar únicamente animales sanos.

#### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

##### Advertencias para el Usuario:

Este producto contiene un aceite mineral. Su inyección accidental (autoinyección) puede provocar dolor agudo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo y, ocasionalmente podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona con urgencia atención médica.

En caso de inyectarse accidentalmente este producto, busque urgentemente atención médica, incluso si se ha inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, solicite de nuevo atención médica.

### Advertencias para el Médico:

Este producto contiene un aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa, que podría ocasionar una necrosis isquémica e incluso, la pérdida del dedo. Es necesaria la atención médica experta e INMEDIATA y puede ser preciso practicar tempranamente una incisión e irrigar la zona, especialmente si está afectada la yema del dedo o el tendón.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO:

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

#### Formatos:

Caja con 1 vial de 1.000 dosis (500 ml).

Reg. No. ES240-65-91-3666  
Prescripción veterinaria

USO VETERINARIO

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) SPAIN

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

HIPRA