



Canigen® MHA2PPi/L

FRACCIÓN LIOFILIZADA: VACUNA VIVA ATENUADA PARA LA INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA MOQUILLO, HEPATITIS INFECCIOSA, PARVOVIRUS CANINO Y COMPLEJO RESPIRATORIO CAUSADO POR ADENOVIRUS TIPO 2 Y PARAINFLUENZA CANINA  
FRACCIÓN LÍQUIDA: ANTÍGENOS INACTIVADOS PARA LA INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA LEPTOSPIROSIS CANINA

Reg. SAGARPA B-0042-018

USO VETERINARIO

Consulte al Médico Veterinario

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza, Parvovirus canino y Leptospirosis canina.

RECOMENDADO PARA: Perros

FÓRMULA

La Fracción liofilizada contiene virus atenuados de:

Virus Distemper canino (cepa Lederle)	103 a 105 DIC50
Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan)	104 a 106 DIC50
Parvovirus canino (cepa CPV 780916)	105 a 107 DIC50
Parainfluenza canina (cepa Manhattan)	105 a 107 DIC50
Excipiente c.b.p.	1 dosis

La fracción líquida contiene *Leptospira interrogans* inactivadas de:

<i>Leptospira canicola</i>	no menos de $8.33 \times 10^8$ bacterias
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i>	no menos de $8.33 \times 10^8$ bacterias
Excipiente c.b.p.	1 ml

DOSIS Y MODO DE USO: Administrar 1 dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad, seguida de una revacunación de 3 a 4 semanas después. Refuerzo anual.

#### ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN: Caja con 10 dosis.