

# Hunter 10

Hunter 10% suspensión oral es un antihelmíntico de amplio espectro para administrarse en bovinos, equinos, ovejas y otros animales domésticos.

Esta indicado para el tratamiento de fases maduras de parásitos gastrointestinales y pulmonares. También es ovicida. Para el tratamiento de vacas y ovejas infectadas con:

*Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Trichuris spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesopagostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, y *Dictocaulus viviparus* en ganado *Dictyocaulus filaria* en ovejas.

Hunter 10 efectivamente trata y controla las siguientes infecciones de gusanos redondos: *strongilus* (estados de larvas de adultos y migrantes de *strongilus vulgaris*; adultos y etapas larvales del tejido de *strongilus edentatus*). Benzimidazole adulto susceptible y pequeños *strongilus* no maduras (*Cyathostomes*). También efectivo para el tratamiento y control de la 3ra. y 4ta. Etapa pequeña mucosa larva estrangula y también efectivo contra el 3er. Estado pequeño inhibido de larva estrangula en la mucosa. Adulto e inmaduro *oxyuris spp.*, *Strongiloides spp.* y *Parascaris equorum*.

## Composición

Fenbendazol 100mg/ml (10%w/v)

## Dosificación:

Ganado: 5.0mg Fenbendazole/kg peso corporal.

Caballos: 7.5mg Fenbendazole/kg peso corporal.

Ovejas y Cabras: 5.0mg Fenbendazole/kg peso corporal.

Cerdos: 5.0mg Fenbendazole/kg peso corporal.

## Administración:

Antes de usarse, se debe agitar bien. No necesita diluirse.

Se debe aplicar con una dosificadora oral de buena calidad.

No se necesita que a los animales se les ajuste la dieta antes o después de aplicarlo.

## Guía Para

### Dosificación:

Bovinos, ovejas, cabras y cerdos: 5.0ml de Hunter 10 Drench por 100kg de peso

Caballos: 7.5ml de Hunter 10 Drench por 100kg de peso

Peso (kg)	Hunter 10 Drench dosis ml/animal	
	Bovinos, ovejas y cabras	Caballos
10	0.5 ml	0.75 ml
20	1.0ml	1.50 ml
30	1.5 ml	2.25 ml
40	2.0ml	3.0 ml
50	2.5 ml	3.75 ml
100	5ml	7.5 ml
200	10 ml	15.0ml
300	15 ml	22.5 ml
400	20 ml	30.0 ml
500	25 ml	37.5 ml



**Periodo de Retiro:**

Los animales no pueden ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento o dentro de 14 días pasado el tratamiento.

Leche no pueden ser usados para consumo humano durante el tratamiento o dentro de 72 horas del último tratamiento.

**Almacenaje:**

Guárdese en lugar fresco y seco.

Proteger de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Empaque:**

Envase plástico de 1 y 2.5 litros.



# Hunter 22 Granular

Un antihelmintico para el tratamiento de bovinos, ovejas, caballos y cerdos.

## **BOVINOS:**

Para el tratamiento de formas maduras e inmaduras de nematodos de el tracto respiratorio y gastrointestinal. También normalmente efectivo contra larvas inhibidas de *ostertagia spp* y contra *moniezia spp*.

## **OVEJAS**

Para el tratamiento de formas inmaduras y maduras de nematodos de el tracto respiratorio y gastrointestinal. También usualmente efectivo contra *moniezia spp* y variablemente efectivo contra *Trichuris spp*.

## **CABALLOS**

Para el tratamiento y control de gusanos redondos adultos y fases inmaduras de el tracto gastrointestinal en caballos y otros equinos.

## **CERDOS:**

Para el tratamiento de cerdos infectados con nematodos en fases maduras e inmaduras de el tracto gastrointestinal y el control de parásitos pulmonares y gusanos redondos y huevos.

## **COMPOSICIÓN:**

Fenbendazole 22.20% W/W.

## **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:**

La dosis estándar es 5 mg de Fenbendazole por kg de peso (Para caballos y otros equinos usar 7.50 mg de Fenbendazole por kg de peso).

1 x 10g sobres es suficiente para el tratamiento de un animal de 400 kg, ej. 1 g alcanza para tratar 40 kg de peso.

Administrar mezclando en el alimento aplicando sobre el.

## **PERIODO DE RETIRO:**

Bovino y Ovejas:

Los animales no pueden ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento o dentro de 14 días del tratamiento pasado Leche no pueden ser usados para consume humano durante el tratamiento o dentro de 72 horas del último tratamiento.

## **Cerdos**

Los animales no pueden ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento o dentro de 5 días pasados el tratamiento.

## **CONTRA-INDICACIONES, CUIDADOS ETC.**

Pesecuidadosamente como sea posible antes de calcular la dosificación.

Contacto directo con la piel debería tener cuidados mínimos.

Lave las manos después de usarse.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

## **EMPAQUE:**

25 x 10g sobre

