



Curacef® Duo

Cefalosporina betalactámica de amplio espectro y antiinflamatorio no esterooidal

Reg. SAGARPA Q-0042-417

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Curacef® Duo está indicado en bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* y *Pasteurella multocida*; tratamiento de necrobacilosis interdigital aguda causada por *Bacteroides melaninogenicus*, *Fusobacterium necrophorum* y *Fusobacterium nucleatum*, y en infecciones reproductivas causadas por bacterias como *E. coli*, *Corynebacterium spp.* en la metritis puerperal o post parto, ya que son bacterias susceptibles a ceftiofur y asociadas con dolor y/o pirexia y/o inflamación.

Recomendado para: Bovinos productores de carne y leche.

FÓRMULA

Ceftiofur clorhidrato (Equivalente a 50.0 mg de ceftiofur base)	53.5 mg
Ketoprofeno	150 mg
Vehículo c.b.p	1 ml

DOSIS

Enfermedades respiratorias: 1 ml/ 50 kg de peso por día durante 2 a 5 días consecutivos, equivalente a 1 mg de ceftiofur/kg/día y 3 mg ketoprofeno/kg/día.

Si la inflamación cede después de 2 días de tratamiento, Curacef® Duo podrá sustituirse por un tratamiento a base de Ceftiofur clorhidrato, para completar el período de 3 a 5 días de antibioticoterapia.

Necrobacilosis interdigital aguda: 1ml/50 kg de peso por día durante 3 días, equivalente a 1 mg/kg/día de ceftiofur y 3 mg de ketoprofeno/kg/día.

Metritis: 1 ml/50 kg de peso por día durante 3 a 5 días consecutivos, equivalente a 1 mg ceftiofur/kg/día y 3 mg ketoprofeno/kg/día.

Vía de administración; Intramuscular exclusivamente.

ADVERTENCIAS

Manténgase a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa, máximo 30 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Período de retiro: No destinar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 8 días después de la última aplicación. Curacef® Duo no tiene período de retiro en leche para problemas que no involucren la ubre. Después de retirar la primera dosis desechar en 90 días.

Presentaciones: Frasco con 100 mL y 250 mL