

Parvigen®

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra el parvovirus canino.

USO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

¿Para qué sirve?

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra el parvovirus canino.

Indicaciones de uso Para la inmunización activa contra el Parvovirus canino.

Dosificación Administrar una dosis de 1 ml.

Sugerencias de vacunación

Como primera vacunación aplique una dosis entre la 6 y 8 semanas de edad, seguida de revacunación a las 3 ó 4 semanas, a criterio del Médico Veterinario. La administración de Parvigen® a partir de las 6 semanas de edad provee inmunidad activa en ausencia de anticuerpos maternos y animales seronegativos. Los anticuerpos de origen materno pueden en algunos casos, influir en la respuesta inmune a la vacunación. En tales casos se recomienda una tercera administración a partir de las 15 semanas de edad. Refuerzo anual.

Vía de administración Subcutánea.

Especies a las que se destina Caninos.

FÓRMULA

La fracción liofilizada contiene:

Parvovirus Canino vivo cepa atenuada Cornell CVP/780916 105 - 107 DIC50	
Excipiente c.b.p.	1 dosis

La fracción líquida contiene:

Agua para inyectables c.b.p.	1 ml
------------------------------	------

TIEMPO DE SUPRESIÓN No aplica, su uso está intencionado para perros.

EFFECTOS INDESEABLES

Posiblemente, puede ocurrir un ligero edema doloroso o un engrosamiento en el sitio de inyección dentro de las primeras horas después de la vacunación. Desaparece espontáneamente en pocos días sin tratamiento. Como cualquier vacuna, puede ocurrir un shock anafiláctico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.