

## Rabigen® mono

Vacuna antirrábica inactivada en suspensión cepa Pasteur para la inmunización activa contra la Rabia en caninos y felinos domésticos.

### USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

¿Para qué sirve?

Vacuna antirrábica inactivada en suspensión cepa Pasteur para la inmunización activa contra la Rabia en caninos y felinos domésticos.

### Indicaciones de uso

Para la inmunización activa contra la Rabia en caninos y felinos domésticos.

Dosificación Administrar una dosis de 1 ml.

### Sugerencias de vacunación

Como primera vacunación a partir del mes de edad y revacunar cuando tengan 3 meses de edad (NOM). Puede usarse una vacuna hasta los 3 meses de edad a criterio del Médico Veterinario. Refuerzo anual.

Vía de administración Subcutánea.

Especies a las que se destina Caninos y felinos domésticos.

### Fórmula

Cada dosis de 1 ml contiene:

Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP12 .....  $\geq 1$  U.I.

Excipiente c.b.p/c.s.p. .... 1 dosis

TIEMPO DE SUPRESIÓN No aplica, su uso está intencionado para perros y gatos.

### EFFECTOS INDESEABLES

En dosis repetidas, en algunas ocasiones se han observado solamente reacciones locales suaves y transitorias.

Posiblemente, puede ocurrir un ligero edema doloroso o un engrosamiento en el sitio de inyección dentro de las primeras horas después de la vacunación. Desaparece espontáneamente en pocos días sin tratamiento. Como cualquier vacuna, puede ocurrir un shock anafiláctico.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.