

Rilexine® 200 NP

Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis ambiental.

Reg. SAGARPA Q-0042-316

USO VETERINARIO

Consulte al Médico Veterinario

Su venta requiere receta médica.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para el tratamiento de mastitis de vacas en producción láctea causadas por gérmenes sensibles a la fórmula (neomicina + cefalexina)

RECOMENDADO PARA: Vacas en producción láctea.

FÓRMULA

Cefalexina (monohidrato)	100 mg
Neomicina (sulfato)	100 mg
Prednisolona	10 mg
Excipiente c.b.p	10 mL

DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 horas durante 2 ó 3 días.

- Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación.
- Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón.
- Aplique un ligero masaje sobre la ubre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramamaria

ADVERTENCIAS

- No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados hasta 10 ordeños posteriores a la última administración (5 días).
- Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol, máximo 30°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentaciones

- 24 jeringas de 10 ml cada una.